

## Tableau des présentations des suspensions buvables en fonction du poids des enfants

Poids corporel de l'enfant	Choix de la présentation de la suspension buvable	Caractéristiques de la seringue-doseuse	Commentaires
Poids < 4 kg	Clarithromycine 25 mg/ml	<p><u>Pour toutes les spécialités commercialisées :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Graduation de la seringue de 1 kg en 1 kg</li> <li>• Marquage du poids en kg à partir de 2 kg jusqu'à 25 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécialités en très forte tension conduisant à cibler leur utilisation dans la population pour laquelle ce dosage est le plus adapté</li> <li>• Présentation la plus appropriée pour les plus petits poids</li> </ul>
Poids > 4 kg	Clarithromycine 50 mg/ml	<p><u>Pour toutes les spécialités commercialisées :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Graduation de la seringue de 1 kg en 1 kg</li> <li>• Marquage du poids en kg à partir de 4 kg jusqu'à 50 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosage 50 mg/ml pouvant être utilisé chez des enfants de faibles poids</li> <li>• Spécialités dont la graduation de la seringue-doseuse est marquée en kg à partir de 4 kg</li> </ul>
Quel que soit le poids de l'enfant	Azithromycine 40 mg/ml	<p><u>Pour la seule spécialité commercialisée :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Graduation de la seringue de 0,5 kg en 0,5 kg</li> <li>• Marquage du poids en kg à partir de 5 kg jusqu'à 25 kg</li> </ul> <p><u>Pour des poids &lt; 5 kg :</u></p> <p>Marquage sur la seringue-doseuse de traits sans mention du poids correspondant en kg : 1er trait (équivalent à 0 kg) jusqu'à un trait (équivalent à un poids de 4,5 kg)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Absence de limite d'âge pour son utilisation d'après les <a href="#">recommandations</a></li> <li>• Spécialité dont la seringue-doseuse est graduée par 0,5 kg à partir de 0 kg</li> </ul>