



SURVEILLANCE - PHARMACOVIGILANCE

PUBLIÉ LE 18/10/2021

# Savez-vous bien utiliser le paracétamol contre la douleur et la fièvre ?

Les médicaments contenant du paracétamol font partie des médicaments les plus utilisés pour soulager les douleurs ou pour lutter contre la fièvre chez les adultes et les enfants.

Utilisé à bon escient, le paracétamol est un médicament sûr et efficace. Cependant en cas de surdosage, le paracétamol peut entraîner des lésions graves du foie irréversibles dans certains cas

A l'occasion de la journée de mondiale de lutte contre la douleur, l'ANSM rappelle les clés pour utiliser le paracétamol en toute sécurité.

Une règle à retenir : le paracétamol s'utilise à la dose efficace la plus faible possible et pendant la durée la plus courte.

## Que dois-je savoir?

Le terme surdosage s'entend par l'utilisation d'un dosage non adapté, une dose trop importante par prise ou par jour, et un délai minimum entre les prises non respecté. La mauvaise utilisation du paracétamol est la 1ère cause de greffe hépatique d'origine médicamenteuse en France.

La posologie (dosage et fréquence de prise) de paracétamol que vous pouvez prendre en cas de douleur ou de fièvre dépend de votre poids et de votre état de santé. Pour éviter un surdosage, respectez les posologies et les précautions d'emploi suivantes :

Enfant entre 27 kg (à partir de 8 ans environ) et 50 kg

Personnes de plus de 50 kg (à partir de 15 ans environ) hors cas particuliers\*

#### Par quelle dose Commencez par 500 mg, à Commencez par 500 mg, à commencer et à quelle renouveler si besoin au renouveler si besoin au fréquence? bout de 6h bout de 4h. En cas de douleurs ou de fièvre plus intenses, vous pouvez débuter par la prise de 1 gramme en laissant un intervalle de 6h entre 2 prises Dose maximale journalière La dose journalière dépend Ne dépassez jamais de du poids de l'enfant vous-même 3 grammes par (environ 60 mg/kg par jour) Seul votre médecin pourra Chez un enfant de moins de augmenter si besoin la dose 40kg, il ne faudra pas journalière mais sans jamais dépasser 4 grammes dépasser 2 grammes (soit 4 comprimés de 500 mg par jour). **Durée de traitement** Si les douleurs persistent plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours consultez votre médecin

### \*Cas particuliers :

- Si vous avez une maladie des reins, du foie, vous souffrez d'alcoolisme chronique, vous pesez moins de 50 kg : consultez un professionnel de santé avant de prendre du paracétamol.
- Si vous êtes enceinte : en règle générale, la prise de médicament doit être évitée pendant cette période. Toutefois, si besoin, votre professionnel de santé pourra vous conseiller de prendre du paracétamol mais toujours à la dose efficace la plus faible possible et pendant la durée la plus courte.
- Chez les jeunes enfants (moins de 27 kg) : la posologie du paracétamol sera choisie en fonction du poids de l'enfant. Des médicaments à base paracétamol adaptés aux enfants sont disponibles.
  Demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin.

#### Attention au paracétamol caché!

Plus de 200 médicaments commercialisés en France contiennent du paracétamol, seul ou associé à d'autres substances actives. Ces médicaments sont utilisés pour le traitement des douleurs, fièvre, allergies, symptômes du rhume ou état grippal. Ne prenez jamais en même temps un autre médicament contenant du paracétamol. Pour le vérifier, consultez la face principale des boîtes des médicaments, les substances actives que contiennent les médicaments y sont toujours précisées.



L'ANSM a engagé un partenariat avec le Youtubeur WhyDoc, le docteur Corentin Lacroix, pour développer des vidéos sur la thématique du bon usage des médicaments. Après « médicaments et grossesse », il met à disposition une nouvelle vidéo sur le bon usage du paracétamol. Pour la découvrir, c'est par ici.



Vous pouvez également consulter la vidéo réalisée par l'OFMA / Analgesia sur le bon usage du paracétamol