

PUBLIÉ LE 29/06/2026

Fortes tensions d’approvisionnement sur les comprimés gastro-résistants à base d’acide acétylsalicylique (aspirine) 75 mg et 100 mg

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ - MÉDICAMENTS

Le laboratoire Pfizer a informé l’ANSM de difficultés de production de son médicament Resitune (acide acétylsalicylique, aspirine) 75 mg et 100 mg, comprimés gastro-résistants. Cette situation engendre de fortes tensions d’approvisionnement sur l’ensemble des médicaments à base d’acide acétylsalicylique 75 mg et 100 mg, comprimés gastro-résistants.

Afin de permettre la continuité des traitements et après consultation des représentants des patients et des professionnels de santé, l’ANSM publie, à titre exceptionnel et temporaire, une recommandation autorisant les pharmaciens à remplacer entre eux les médicaments à base d’acide acétylsalicylique 75 mg et 100 mg en comprimés gastro-résistants en fonction des disponibilités de ces deux traitements.

L’acide acétylsalicylique (aspirine) 75 mg et 100 mg est utilisé pour réduire le risque de caillots dans le sang et prévenir notamment les récidives d'infarctus du myocarde et d’accident vasculaire cérébral ischémique (dû à l'obstruction d'un vaisseau sanguin dans le cerveau).

Le laboratoire Pfizer nous a informés de difficultés de production affectant la mise à disposition de son médicament Resitune (acide acétylsalicylique) 75 et 100 mg, comprimés gastro-résistants. Le laboratoire estime que ses approvisionnements reviendront à la normale début 2027. Cette situation conduit à **des difficultés, dues aux reports, sur les médicaments à base d’acide acétylsalicylique 75 mg et 100 mg comprimés gastro-résistants.**

Dans ce contexte, nous avons demandé aux laboratoires qui commercialisent ces médicaments d’augmenter leurs approvisionnements afin de limiter l’impact sur les patients.

Nous publions une recommandation de remplacement, appuyée sur lesrecommandations européennes en vigueur dans la prévention cardiovasculaire, mentionnant l’usage de doses d’aspirine pouvant aller de 75mg à 150mg par jour.

La recommandation permet aux pharmaciens, à titre exceptionnel et temporaire, de remplacer entre elles, en l’absence de groupe générique, les spécialités d’acide acétylsalicylique en comprimés gastro-résistants de dosage équivalent en cas d’indisponibilité du médicament prescrit.
Par ailleurs, cette recommandation autorise les pharmaciens à dispenser, si aucun dosage équivalent n’est disponible :

- Un médicament à base d’acide acétylsalicylique 75 mg comprimés gastro-résistants à la place d’un dosage à 100 mg ;
- Un médicament à base d’acide acétylsalicylique 100 mg comprimés gastro-résistants à la place d’un dosage à 75 mg.

Consultez la recommandation de remplacement

Informations pour les patients

- N'interrompez pas votre traitement sans avis médical ;

- En cas d'indisponibilité de votre traitement habituel à base d’acide acétylsalicylique présenté sous forme de comprimés gastro-résistants dosés à 75 mg ou 100 mg, votre pharmacien pourra vous délivrer un autre médicament à base d’acide acétylsalicylique sous forme de comprimés gastro-résistants dosés à 75 mg ou 100 mg.
- Si vous avez des questions sur votre traitement ou sur ce remplacement, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

Informations pour les pharmaciens

- Si le médicament à base d’acide acétylsalicylique en comprimés gastro-résistants initialement prescrit n’est pas disponible, vous pouvez, à titre exceptionnel et temporaire, délivrer directement un autre médicament à base d’acide acétylsalicylique comprimés gastro-résistants de même dosage, et ce malgré l’absence de groupe générique ;
- Lorsqu’un dosage (75 ou 100 mg) n’est pas disponible, vous pouvez délivrer, dans le cadre de la recommandation de remplacement, l’autre dosage disponible sous forme de comprimés gastro-résistants.
- Respectez les modalités de dispensation prévues dans la recommandation ;
- Informez le patient du remplacement de dosage réalisé et vérifiez le cas échéant, sa bonne compréhension de la nouvelle posologie.

Informations pour les médecins

- Informez vos patients de la possibilité que le pharmacien remplace au moment de la dispensation le médicament prescrit par un autre dosage ;
- Rappelez à vos patients de ne pas interrompre leur traitement sans avis médical et de signaler tout effet indésirable ou symptôme clinique qu'il jugerait inhabituel lié à ce changement de médicament.

Lire aussi

TENSION D'APPROVISIONNEMENT
PUBLIÉ LE 21/05/2026

Acide acétylsalicylique 75 mg, , comprimé gastro-résistant – [acide acétylsalicylique]

Pour en savoir plus

2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice - European Heart Journal