



PUBLIÉ LE 21/07/2026

Confusion entre solutions incolores d'antiseptiques et d'anesthésiques : une erreur qui peut être évitée

SURVEILLANCE - PHARMACOVIGILANCE

Des cas de confusion entre des solutions antiseptiques et d'anesthésiques nous ont été signalés. Ces erreurs, aux conséquences graves, nous conduisent à rappeler les mesures de sécurisation à mettre en œuvre, notamment le recours à des antiseptiques colorés. Nous appelons également les professionnels de santé à une vigilance renforcée.

Nous avons été informés d'un nouveau cas de confusion entre des solutions incolores d'antiseptique et d'anesthésique, ayant abouti à l'injection accidentelle de l'antiseptique.

Ce type de confusion, comme l'utilisation par erreur d'une solution antiseptique à base de chlorhexidine à la place de sérum physiologique ou d'un anesthésique local (comme la Xylocaïne) a déjà été rapporté. Ces situations peuvent survenir lors de différents gestes techniques, tels que les blocs nerveux ou la manipulation de tubulures.

Ces confusions peuvent entraîner des conséquences majeures, notamment des atteintes neurologiques sévères (jusqu'à la tétraplégie) ou des décès.

Mesures de prévention recommandées

Pour réduire ce risque de confusion, nous rappelons plusieurs mesures de sécurité à respecter :

- Privilégiez les antiseptiques colorés ou les tampons cutanés imprégnés en applicateur, l'antiseptique incolore restant alors dans le manche de l'applicateur ;
- Évitez autant que possible de déconditionner le médicament injectable, laissez-le dans son contenant d'origine.

Pour en savoir plus

[Comment éviter la confusion entre antiseptique et anesthésique injectable ?](#)