

PUBLIÉ LE 23/07/2026 - MIS À JOUR LE 21/10/2026

Tensions en collyres : bien les prescrire pour préserver les stocks disponibles

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ - MÉDICAMENTS

Des tensions d'approvisionnement touchent différents collyres depuis plusieurs mois pour des raisons variées. Ces tensions sont aujourd'hui accentuées par les difficultés rencontrées sur le site de production français d'Excelvision.
Dans ce contexte, nous avons mis en œuvre des mesures pour atténuer leur impact et nous invitons les professionnels de santé à adapter, dès lors que cela est possible, les prescriptions et les dispensations aux besoins des patients, afin de préserver les stocks disponibles.

Liste des collyres concernés par les difficultés d'Excelvision

Collyres en situation de très forte tension d'approvisionnement :

- Fluoresceine Faure 0,5%, collyre en solution en récipient unidose (fluorescéine) ;
- Mydriaticum 2 mg/0,4 mL, collyre en récipient unidose (tropicamide).

Autres collyres en tension d'approvisionnement :

- Néosynéphrine 2,5 % Faure, collyre en solution en récipient unidose (phényléphrine) ;
- Néosynéphrine 10 % Faure, collyre en solution en récipient unidose (phényléphrine) ;
- Voltarenophta 0,1 pour cent (0,3 mg/0,3 ml), collyre en solution en récipient unidose et Voltarenophtabak 1 mg/ml, collyre en solution (diclofénac) ;
- Verkazia 1 mg/mL collyre en émulsion (ciclosporine) ;
- Chlorhydrate d'oxybuprocaïne Thea 1,6 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose (oxybuprocaïne) ;
- Tétracaïne 1% Théa, collyre en solution en récipient unidose ;
- Dexocol 1 mg/mL, collyre en solution (dexaméthasone) ;
- Chibroxine 0,3%, collyre en solution (Norfloxacine).

Ces tensions concernent principalement les collyres unidoses, dans un contexte déjà fragile à l'international pour certains médicaments ophtalmologiques. Nous travaillons avec les laboratoires concernées à la normalisation de la situation, qui passe notamment par des importations mises en place à notre demande.

Pour certains médicaments, des alternatives ou des présentations différentes peuvent permettre de couvrir une partie des besoins des patients.

Adaptez les prescriptions et les dispensations aux besoins des patients

Afin de limiter l'impact de ces tensions sur la prise en charge des patients, nous demandons aux professionnels de santé de :

- Ne recourir aux collyres que dans les situations où leur utilisation est indispensable et ne peut être reportée ;
- Privilégier les alternatives disponibles dès lors que cela est possible ;
- Limiter les prescriptions et les dispensations aux quantités strictement nécessaires ;

- Éviter la constitution de stocks de précaution.

Les professionnels de santé sont invités à consulter les fiches ruptures de stock des médicaments concernés (voir liste ci-dessus), qui détaillent les mesures mises en place pour faire face aux tensions d'approvisionnement.

Nous suivons de près la situation avec les représentants des professionnels de santé afin d'adapter, si nécessaire, les mesures de gestion et limiter l'impact de ces tensions pour les patients.



Bon usage des collyres

En lien avec cette information



PUBLIÉ LE 21/10/2026

Tensions d'approvisionnement en Verkazia : Ikervis peut être dispensé temporairement aux enfants et adolescents

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ
MÉDICAMENTS



PUBLIÉ LE 30/09/2026 - MIS À JOUR LE 21/10/2026

Tensions d'approvisionnement en Verkazia : ce collyre doit être réservé aux enfants et aux adolescents exclusivement

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ
MÉDICAMENTS