



PUBLIÉ LE 21/10/2026

Tensions d'approvisionnement en Verkazia : Ikervis peut être dispensé temporairement aux enfants et adolescents

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ - MÉDICAMENTS

Dans le cadre de nos actions pour pallier les tensions en Verkazia (ciclosporine 1 mg/mL, collyre en émulsion) et permettre aux enfants et adolescents de poursuivre leur traitement, nous publions une recommandation de remplacement.

Celle-ci autorise les pharmaciens, en cas d'indisponibilité de Verkazia, à dispenser directement aux enfants et adolescents, à titre exceptionnel et temporaire, le médicament Ikervis (ciclosporine 1 mg/mL, collyre en émulsion) en remplacement, sans qu'une nouvelle ordonnance soit nécessaire.

Le médicament Ikervis 1 mg/mL, collyre en émulsion à base de ciclosporine habituellement utilisé pour le traitement de la kératite sévère chez des patients adultes, a la même composition que Verkazia.

Comme Verkazia, Ikervis fait l'objet de tensions d'approvisionnement liées aux problèmes de production sur le site d'Excelvision. Cependant, afin d'assurer la continuité de traitement des patients pédiatriques, les boîtes d'Ikervis ont été placées en stock de dépannage auprès du laboratoire Santen. Elles sont disponibles en commande directe des pharmacies auprès du laboratoire, **pour les enfants et adolescents exclusivement, et leur seront délivrées gratuitement**.

Les patients adultes peuvent recourir à d'autres médicaments à base de ciclosporine.

Le laboratoire exploitant prévoit actuellement une remise à disposition normale de Verkazia en pharmacie courant décembre 2026.

Informations pour les patients pédiatriques et leurs parents

- Si Verkazia n'est pas disponible, votre pharmacien pourra vous délivrer gratuitement le collyre Ikervis en remplacement. Attention, cette mesure ne concerne que les enfants et les adolescents ;
- Ikervis a la même composition que Verkazia (ciclosporine 1 mg/mL, collyre en émulsion). Seul le nombre de doses par boîte diffère : boîte de 30 unidoses pour Ikervis, contre 120 unidoses pour Verkazia. Ikervis est habituellement utilisé chez l'adulte pour le traitement de la kératite sévère ;
- Le pharmacien vous remettra un exemplaire de la notice de Verkazia avec la boîte d'Ikervis, ainsi qu'un courrier du laboratoire. Respectez la prescription de Verkazia et consultez sa notice pour utiliser Ikervis (nombre de gouttes par jour) ;
- En cas d'effet indésirable ou de symptôme inhabituel après ce changement de médicament, consultez votre médecin.

Informations pour les pharmaciens

- En présence d'une prescription de Verkazia pour un enfant de quatre ans ou plus ou un adolescent, commandez

le collyre Ikervis auprès du laboratoire Santen. Les boîtes issues du stock de dépannage de Ikervis seront fournies gracieusement aux officines par le laboratoire et dispensées sans frais aux patients concernés. Ces boîtes seront accompagnées d'un exemplaire de la notice de Verkazia et d'un courrier du laboratoire, qui devront être remis au patient ;

- Informez le patient ou sa famille que les boîtes d'Ikervis délivrées en remplacement de Verkazia doivent être utilisées selon la prescription de Verkazia et sa notice ;
- Dispensez Ikervis conformément à la recommandation de remplacement, en raison du stock de dépannage limité (pour 15 jours de traitement : 1 boîte maximum en dose d'entretien recommandée à la fin de la saison d'été, ou 2 boîtes maximum en dose maximale si les signes et symptômes persistent) ;
- Informez le médecin prescripteur de ce remplacement ;
- Conseillez au patient ou à sa famille de revoir son médecin en cas d'effet indésirable ou de symptôme inhabituel qui pourrait être lié à ce changement de médicament.



Consultez la recommandation de remplacement destinée aux pharmaciens

Informations pour les ophtalmologues

- Réservez la prescription de Verkazia à son indication en pédiatrie, à savoir la kératoconjonctivite vernale (KCV) sévère chez les enfants à partir de 4 ans et les adolescents ;
- Limitez les prescriptions aux quantités strictement nécessaires et adaptez la posologie des traitements par Verkazia : si les symptômes de la kératoconjonctivite vernale (printanière) persistent après la fin de la saison d'été, le traitement peut être réduit à la posologie d'entretien d'une goutte deux fois par jour dans chaque œil, dès lors que ces symptômes sont contrôlés de façon satisfaisante. Le traitement doit être arrêté après la disparition des symptômes ;
- Informez vos patients de la possibilité que le pharmacien remplace au moment de la dispensation le médicament Verkazia prescrit par Ikervis.

Lire aussi

TENSION D'APPROVISIONNEMENT

PUBLIÉ LE 15/06/2026 - MIS À JOUR LE 21/10/2026

Verkazia 1 mg/mL, collyre en émulsion – [ciclosporine]

TENSION D'APPROVISIONNEMENT

PUBLIÉ LE 16/10/2026 - MIS À JOUR LE 21/10/2026

Ikervis 1 mg/mL, collyre en émulsion – [ciclosporine]

- En lien avec cette information



PUBLIÉ LE 30/09/2026 - MIS À JOUR LE 21/10/2026

Tensions d'approvisionnement en Verkazia : ce collyre doit être réservé aux enfants et aux adolescents exclusivement

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ
MÉDICAMENTS



PUBLIÉ LE 23/07/2026 - MIS À JOUR LE 21/10/2026

Tensions en collyres : bien les prescrire pour préserver les stocks disponibles

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ
MÉDICAMENTS