

# Rifadine 300 mg, gélule, boîte de 30 – [rifampicine]

Tension d'approvisionnement 21/03/2024

## DCI

Rifampicine

## Indications

Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de la rifampicine. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu ce médicament et de sa place dans l'éventail des produits antibactériens actuellement disponibles.

Elles sont limitées à :

- 2.**
- 1.** Tuberculose sous toutes ses formes
  1. -
    - a) Traitement en polythérapie :
      1. - tuberculose pulmonaire de 1ère atteinte ou rechute.
      2. - tuberculoses extra-pulmonaires: méningite tuberculeuse, tuberculose uro-génitale, ostéo-articulaire, ganglionnaire, des séreuses, digestives, hépatosplénique, cutanée, etc...
    2. -
    - b) Chimio prophylaxie en bi ou monothérapie :
      1. - virages isolés des réactions cutanées tuberculiques,
      2. - sujets à réactions tuberculiques négatives, en contact avec des tuberculeux bacillaires,
      3. - patients immunodéprimés en présence d'un contact avec des tuberculeux bacillaires ou susceptibles d'un réveil tuberculeux.
  - 3.** Autres infections à mycobactéries sensibles
  - 4.** Lèpre dans le cadre de la polythérapie
  - 5.** Brucellose
  - 6.** Infections graves, traitées en milieu hospitalier à germes Gram + (staphylocoques, entérocoques) ou à germes Gram - sensibles
  - 8.**
  - 7.** Prophylaxie des méningites à méningocoque :
    1. - le but est d'éradiquer le germe (*Neisseria meningitidis*) du nasopharynx,
    2. - la rifampicine n'est pas un traitement de la méningite à méningocoque,
    3. -
      - elle est préconisée en prophylaxie chez deux types de personnes :
        1. - le malade après son traitement curatif et avant sa réintégration en collectivité,
        2. - les sujets ayant été exposés aux sécrétions oropharyngées du malade dans les dix jours précédant son hospitalisation.
    4. - La décision de traiter l'ensemble des membres d'une collectivité, en particulier les enfants, doit tenir compte des risques « d'exposition ». Cette prescription doit être rigoureuse afin de limiter les effets secondaires de la rifampicine et la

possibilité d'apparition de souche résistante

## Laboratoire exploitant

Sanofi Winthrop Industrie

### Observations particulières

- Tension d'approvisionnement.
- Mise en place, pour la ville, d'une dotation à 100 % du marché. L'hôpital est approvisionné normalement.
- D'autres laboratoires peuvent répondre aux besoins.
- Remise à disposition en avril 2026.

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles de vente et l'exportation du médicament par les autorités publiques 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L.5121-30 et L.5124-17-3 du Code de Santé Publique. Cette mesure d'interdiction de vendre en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition d'un nouveau médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.*

## ● Voir toutes les produits



PUBLIÉ LE 18/04/2024 - MIS À JOUR LE 06/02/2025

La disponibilité des médicaments à base de rifampicine s'améliore, le dispositif de restriction des indications est allégé

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ  
MÉDICAMENTS

[+ Voir toutes les produits](#)