

Rifadine 300 mg, gélule, boite de 30 - [rifampicine]

Tension d'approvisionnement 21/03/2024

DCI

Rifampicine

Indications

Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de la rifampicine. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu ce médicament et de sa place dans l'éventail des produits antibactériens actuellement disponibles.

Elles sont limitées à :

2.

1. Tuberculose sous toutes ses formes

1. -

- a) Traitement en polythérapie :
 - 1. - tuberculose pulmonaire de 1ère atteinte ou rechute.
 - 2. - tuberculoses extra-pulmonaires: méningite tuberculeuse, tuberculose uro-génitale, ostéo-articulaire, ganglionnaire, des séreuses, digestives, hépatosplénique, cutanée, etc...

2. -

- b) Chimioprophylaxie en bi ou monothérapie :
 - 1. - virages isolés des réactions cutanées tuberculiniques,
 - 2. - sujets à réactions tuberculiniques négatives, en contact avec des tuberculeux bacillaires,
 - 3. - patients immunodéprimés en présence d'un contact avec des tuberculeux bacillaires ou susceptibles d'un réveil tuberculeux.

3. Autres infections à mycobactéries sensibles

4. Lèpre dans le cadre de la polythérapie

5. Brucellose

6. Infections graves, traitées en milieu hospitalier à germes Gram + (staphylocoques, entérocoques) ou à germes Gram - sensibles

8.

7. Prophylaxie des méningites à méningocoque :

- 1. - le but est d'éradiquer le germe (*Neisseria meningitidis*) du nasopharynx,
 - 2. - la rifampicine n'est pas un traitement de la méningite à méningocoque,
 - 3. - elle est préconisée en prophylaxie chez deux types de personnes :
 - 1. - le malade après son traitement curatif et avant sa réintégration en collectivité,
 - 2. - les sujets ayant été exposés aux sécrétions oropharyngées du malade dans les dix jours précédent son hospitalisation.
4. - La décision de traiter l'ensemble des membres d'une collectivité, en particulier les enfants, doit tenir compte des risques « d'exposition ». Cette prescription doit être rigoureuse afin de limiter les effets secondaires de la rifampicine et la

possibilité d'apparition de souche résistante

Laboratoire exploitant

Sanofi Winthrop Industrie

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement.
- Mise en place, pour la ville, d'une dotation à 100 % du marché. L'hôpital est approvisionné normalement.
- D'autres laboratoires peuvent répondre aux besoins.
- Remise à disposition en avril 2026.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les distributeurs et les pharmaciens est interdite à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'à la fin de la mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national. Les dispositions de l'article L. 5121-30 du code la Santé publique, relative à l'interdiction de vente en dehors du territoire national, et des dispositions des articles L. 5124-17 et L. 5124-17-5 du code la Santé publique, relative à l'interdiction de vente et d'exportation, sont étendues à ce médicament.

● [Voir toutes les produits](#)



PUBLIÉ LE 18/04/2024 - MIS À JOUR LE 06/02/2025

La disponibilité des médicaments à base de rifampicine s'améliore, le dispositif de restriction des indications est allégé

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ MÉDICAMENTS

[+ Voir toutes les produits](#)