

Paclitaxel AHCL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion - flacon de 100 ml - [paclitaxel]

Tension d'approvisionnement 07/09/2023

DCI

Paclitaxel

Indications

Cancer de l'ovaire

- En chimiothérapie de première intention du cancer de l'ovaire, le paclitaxel est indiqué, en association avec du cisplatine, pour le traitement des patientes présentant un carcinome avancé de l'ovaire ou une tumeur résiduelle (> 1 cm) après une laparotomie initiale.
- En chimiothérapie de deuxième intention du cancer de l'ovaire, le paclitaxel est indiqué pour le traitement du carcinome métastatique de l'ovaire après l'échec d'un traitement standard à base de platine.

Cancer du sein

- A titre de traitement adjuvant, le paclitaxel est indiqué pour le traitement des patientes présentant un carcinome mammaire à ganglions positifs après un traitement par anthracycline et cyclophosphamide (AC). Le traitement adjuvant par le paclitaxel doit être envisagé comme une alternative au traitement prolongé par AC.
- Le paclitaxel est indiqué pour le traitement initial du cancer du sein localement avancé ou métastatique, soit en association avec une anthracycline chez les patients pour qui le traitement par les anthracyclines est approprié, soit en association avec le trastuzumab, chez les patients qui surexpriment HER-2 (récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain) à un niveau 3+ tel que déterminé par immunohistochimie et pour qui une anthracycline n'est pas appropriée (voir rubriques 4.4 et 5.1).
- En monothérapie, le paclitaxel est indiqué pour le traitement du carcinome mammaire métastatique chez les patientes n'ayant pas répondu à un traitement standard à base d'anthracyclines ou pour lesquelles ce traitement est contre-indiqué.

Cancer bronchique non à petites cellules avancé

- Le paclitaxel, en association avec le cisplatine, est indiqué pour le traitement du cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) chez les patients pour lesquels une chirurgie potentiellement curative et/ou une radiothérapie n'est pas indiquée.

Sarcome de Kaposi lié au SIDA

- Le paclitaxel est indiqué pour le traitement des patients présentant un sarcome de Kaposi (SK)

Laboratoire exploitant

Accord Healthcare France SAS

Observations particulières

- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Date de remise à disposition indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens titulaires d'officine de santé publique 2016-41, publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016, et des dispositions des articles L. 5121-30 et L. 5121-31 du Code de Santé Publique et des articles R. 5121-30 et R. 5121-31 du Code de Santé Publique, jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.