

Étoposide Teva, solution injectable pour perfusion – [étoposide]

Remise à disposition 10/09/2025

DCI

Étoposide

Indications

- Cancer testiculaire
 - Étoposide Teva est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement du cancer testiculaire primaire, récidivant ou réfractaire, chez l'adulte.
- Cancer du poumon à petites cellules
 - Étoposide Teva est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement du cancer du poumon à petites cellules, chez l'adulte.
- Lymphome de Hodgkin
 - Étoposide Teva est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement du lymphome de Hodgkin chez l'adulte et les patients pédiatriques.
- Lymphome non-hodgkinien
 - Étoposide Teva est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement du lymphome non-hodgkinien chez l'adulte et les patients pédiatriques.
- Leucémie aiguë myéloïde
 - Étoposide Teva est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement de la leucémie aiguë myéloïde chez l'adulte et les patients pédiatriques.
- Néoplasies trophoblastiques gestationnelles
 - Étoposide Teva est indiqué en traitement de première et de seconde intentions en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés pour les néoplasies trophoblastiques gestationnelles à haut risque chez l'adulte.
- Cancer de l'ovaire
 - Étoposide Teva est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement du cancer non épithélial de l'ovaire, chez l'adulte.
 - Étoposide Teva est indiqué dans le traitement du cancer épithélial de l'ovaire résistant/réfractaire au platine, chez l'adulte.

Laboratoire exploitant

Teva Santé

Observations particulières

- Remise à disposition normale des spécialités Étoposide Teva, solution injectable pour perfusion