

# Étoposide Teva, solution injectable pour perfusion – [étoposide]

Remise à disposition 10/09/2025

## DCI

Étoposide

## Indications

- Cancer testiculaire
  - Étoposide Teva est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement du cancer testiculaire primaire, récidivant ou réfractaire, chez l'adulte.
- Cancer du poumon à petites cellules
  - Étoposide Teva est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement du cancer du poumon à petites cellules, chez l'adulte.
- Lymphome de Hodgkin
  - Étoposide Teva est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement du lymphome de Hodgkin chez l'adulte et les patients pédiatriques.
- Lymphome non-hodgkinien
  - Étoposide Teva est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement du lymphome non-hodgkinien chez l'adulte et les patients pédiatriques.
- Leucémie aiguë myéloïde
  - Étoposide Teva est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement de la leucémie aiguë myéloïde chez l'adulte et les patients pédiatriques.
- Néoplasies trophoblastiques gestationnelles
  - Étoposide Teva est indiqué en traitement de première et de seconde intentions en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés pour les néoplasies trophoblastiques gestationnelles à haut risque chez l'adulte.
- Cancer de l'ovaire
  - Étoposide Teva est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement du cancer non épithélial de l'ovaire, chez l'adulte.
  - Étoposide Teva est indiqué dans le traitement du cancer épithélial de l'ovaire résistant/réfractaire au platine, chez l'adulte.

## Laboratoire exploitant

Teva Santé

## **Observations particulières**

- Remise à disposition normale des spécialités Étoposide Teva, solution injectable pour perfusion