

Mimpara 30 mg, 60 mg et 90 mg comprimé pelliculé – [cinacalcet (chlorhydrate de)]

Rupture de stock 10/06/2024

DCI

Cinacalcet (chlorhydrate de)

Indications

- Hyperparathyroïdie secondaire :
 - Adultes :
 - Traitement de l'hyperparathyroïdie (HPT) secondaire chez les patients adultes dialysés atteints d'insuffisance rénale chronique terminale (IRCT).
 - Population pédiatrique :
 - Traitement de l'hyperparathyroïdie (HPT) secondaire chez les enfants âgés de 3 ans et plus, dialysés, atteints d'insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) chez qui l'HPT secondaire n'est pas correctement contrôlée par les traitements de référence (voir rubrique 4.4).
- Cancer de la parathyroïde et hyperparathyroïdie primaire chez les adultes.
- Diminution de l'hypercalcémie chez les patients adultes présentant :
 - Un cancer de la parathyroïde ;
 - Une hyperparathyroïdie primaire, chez qui la parathyroïdectomie serait indiquée sur la base des taux de calcium sérique (définis par les recommandations thérapeutiques en vigueur) mais chez qui la parathyroïdectomie est contre-indiquée ou n'est pas cliniquement appropriée.

Laboratoire exploitant

Amgen SAS

Observations particulières

- Rupture de stock.
- Disponibilités chez les autres laboratoires.
- Remise à disposition normale premier trimestre 2025.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les autres laboratoires est soumise au régime d'urgence prévu par les dispositions des articles L5124-1 et L5124-2 du Code de Santé Publique jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.

