

PUBLIÉ LE 15/07/2024 - MIS À JOUR LE 27/11/2025

# Méthylphénidate Biogaran, comprimé à libération prolongée – [méthylphénidate (chlorhydrate de)]

Tension d'approvisionnement 17/06/2025

#### DCI

Méthylphénidate (chlorhydrate de)

#### **Indications**

Méthylphénidate Biogaran LP est indiqué dans le cadre d'une prise en charge globale du Trouble Déficitaire de l'Attention avec Hyperactivité (TDAH) chez l'enfant de 6 ans et plus, lorsque des mesures correctives seules s'avèrent insuffisantes.

Le traitement doit être instauré et supervisé par un spécialiste des troubles du comportement de l'enfant.

Le diagnostic doit être établi selon les critères du DSM ou les recommandations de l'ICD en vigueur et doit se fonder sur l'anamnèse et sur une évaluation complète du patient. Le diagnostic ne peut reposer uniquement sur la présence d'un ou plusieurs symptômes.

L'étiologie précise de ce syndrome est inconnue et il n'existe pas de test diagnostique unique. Pour un diagnostic approprié, il est nécessaire d'utiliser des informations d'ordre médical, éducatif, social et psychologique.

Habituellement, une prise en charge globale comporte des mesures psychologiques, éducatives et sociales, ainsi qu'un traitement médicamenteux qui vise à stabiliser les enfants présentant des troubles du comportement caractérisés par des symptômes pouvant inclure : des antécédents de troubles de l'attention (attention limitée) une incapacité à se concentrer, une labilité émotionnelle, une impulsivité, une hyperactivité modérée à sévère, des signes neurologiques mineurs et un EEG anormal. Les capacités d'apprentissage peuvent être altérées.

Un traitement par méthylphénidate n'est pas indiqué chez tous les enfants présentant un TDAH et la décision d'utiliser ce médicament devra se fonder sur une évaluation approfondie de la sévérité et de la chronicité des symptômes de l'enfant, en tenant compte de son âge.

Une prise en charge éducative appropriée est indispensable et une intervention psychosociale est généralement nécessaire. Lorsque les mesures correctives seules s'avèrent insuffisantes, la décision de prescrire un psychostimulant devra se fonder sur une évaluation rigoureuse de la sévérité des symptômes de l'enfant. Le méthylphénidate devra toujours être utilisé dans l'indication autorisée et conformément aux recommandations de prescription et de diagnostic.

### Laboratoire exploitant

Biogaran

## **Observations particulières**

- Remise à disposition normale des spécialités Méthylphénidate Biogaran LP 36 mg, comprimé à libération prolongée et Méthylphénidate Biogaran LP 54 mg, comprimé à libération prolongée
- Tension d'approvisionnement en ville avec distribution contingentée de la spécialité Méthylphénidate Biogaran LP 18 mg, comprimé à libération prolongée

- Remise à disposition prévue fin décembre 2025
- Consultez les recommandations pour les pharmaciens

Atusdese Huser autant gue pessinje kastuationee e tarroet de presenventes sie eksterpte blood avande et levoetaten au ment pariles anté Keste ansvens en entre propiet nom als de hearement de meteore la propiet de la moragne du places de propietée

# Voir toutes les produits



PUBLIÉ LE 22/02/2024 - MIS À JOUR LE 25/08/2025

Difficultés d'approvisionnement en méthylphénidate : l'ANSM publie des recommandations pour les pharmaciens

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ MÉDICAMENTS

+ Voir toutes les produits