

Ropinirole LP 2 mg, 4 mg et 8 mg comprimé pelliculé - [ropinirole (chlorhydrate de)]

Tension d'approvisionnement 25/09/2024

DCI

Ropinirole (chlorhydrate de)

Indications

TraITEMENT de la maladie de Parkinson dans les conditions suivantes :

- traitement de première intention en monothérapie pour différer l'instauration de la dopathérapie ;
- association à la lévodopa en cours d'évolution de la maladie lorsque l'effet de la dopathérapie s'épuise ou devient inconstant, et qu'apparaissent des fluctuations de l'effet thérapeutique (fluctuations de type « fin de dose » ou effets « on-off »).

Laboratoire exploitant

Tous les laboratoires

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement
- Contingentement quantitatif
- Remise à disposition indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les autorités sanitaires et réglementaires belges sont interdites. La vente au public, officielle ou non, est autorisée au 01/09/2026 et des dispositions des articles L. 5121-30 et R. 5121-31 de la loi relative à la sécurité sociale sont appliquées et respectées jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national/