

Recarbrio 500 mg/500 mg/250 mg, poudre pour solution pour perfusion – [cilastatine sodique, imipénem monohydraté, rélébactam monohydraté]

Remise à disposition 01/07/2025

DCI

Cilastatine sodique, imipénem monohydraté, rélébactam monohydraté

Indications

Recarbrio est indiqué dans :

- Le traitement des pneumonies nosocomiales (PN), dont les pneumonies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) chez les adultes (voir rubriques 4.4 et 5.1 du RCP).
- Le traitement d'une bactériémie associée, ou suspectée d'être associée à une PN ou une PAVM chez les adultes.
- Le traitement des infections dues à des bactéries aérobie à Gram négatif chez les adultes pour qui les options thérapeutiques sont limitées (voir rubriques 4.2, 4.4 et 5.1 du RCP).

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

Laboratoire exploitant

MSD France

Observations particulières

- Remise à disposition depuis début juillet 2025

Afin de sécuriser au plus vite la situation en France et de préserver les stocks disponibles devant la cessation d'importation du médicament par les autorités compétentes, le gouvernement a décidé de faire disposer les autorités de tutelle et d'exploitation d'un approvisionnement respectif jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.