

Recarbrio 500 mg/500 mg/250 mg, poudre pour solution pour perfusion – [cilastatine sodique, imipénem monohydraté, rélébactam monohydraté]

Tension d'approvisionnement 07/11/2024

DCI

Cilastatine sodique, imipénem monohydraté, rélébactam monohydraté

Indications

Recarbrio est indiqué dans :

- Le traitement des pneumonies nosocomiales (PN), dont les pneumonies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) chez les adultes (voir rubriques 4.4 et 5.1 du RCP).
- Le traitement d'une bactériémie associée, ou suspectée d'être associée à une PN ou une PAVM chez les adultes.
- Le traitement des infections dues à des bactéries aérobies à Gram négatif chez les adultes pour qui les options thérapeutiques sont limitées (voir rubriques 4.2, 4.4 et 5.1 du RCP).

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

Laboratoire exploitant

MSD France

Observations particulières

- Distribution normale suite à la mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Recarbrio 500 mg/500 mg/250 mg, pó para solução para perfusão - powder for solution for infusion initialement destinées aux marchés irlandais et portugais

↓ Lettre d'information du laboratoire MSD en date du 12/12/2024 à l'attention des professionnels de santé (10/01/2025)

- Date de remise à disposition prévue : fin février 2025

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les distributeurs agréés au Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, en vertu de l'article 91 du Code de Santé Publique, jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.