

PUBLIÉ LE 20/11/2024 - MIS À JOUR LE 10/07/2025

Recarbrio 500 mg/500 mg/250 mg, poudre pour solution pour perfusion – [cilastatine sodique, imipénem monohydraté, rélébactam monohydraté]

Remise à disposition 01/07/2025

DCI

Cilastatine sodique, imipénem monohydraté, rélébactam monohydraté

Indications

Recarbrio est indiqué dans :

- Le traitement des pneumonies nosocomiales (PN), dont les pneumonies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) chez les adultes (voir rubriques 4.4 et 5.1 du RCP).
- Le traitement d'une bactériémie associée, ou suspectée d'être associée à une PN ou une PAVM chez les adultes.
- Le traitement des infections dues à des bactéries aérobies à Gram négatif chez les adultes pour qui les options thérapeutiques sont limitées (voir rubriques 4.2, 4.4 et 5.1 du RCP).

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

Laboratoire exploitant

MSD France

Observations particulières

Remise à disposition depuis début juillet 2025

ANG BRESH KANTHERMEN HER PROBLEMENT OF THE BEST OF THE BEST OF THE SET OF THE SET OF THE PROBLEMENT OF THE PROBLEMENT OF THE PROBLEM OF THE PROBLEMENT OF TH