

Recarbrio 500 mg/500 mg/250 mg, poudre pour solution pour perfusion – [cilastatine sodique, imipénem monohydraté, rélébactam monohydraté]

PUBLIÉ LE 20/11/2024 - MIS À JOUR LE 27/01/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 22/01/2026

DCI

Cilastatine sodique, imipénem monohydraté, rélébactam monohydraté

Indications

Recarbrio est indiqué chez les adultes et les patients pédiatriques dès la naissance dans :

- Le traitement des pneumonies nosocomiales (PN), dont les pneumonies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) ;
- Le traitement d'une bactériémie associée, ou suspectée d'être associée à une PN ou une PAVM ;
- Le traitement des infections dues à des bactéries aérobies à Gram négatif pour qui les options thérapeutiques sont limitées.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens

Laboratoire exploitant

MSD France

Observations particulières

- Situation à l'hôpital : tension
- Distribution contingentée



Lettre d'information du laboratoire MSD France en date du 27/01/2026 à l'attention des professionnels de santé

- Date de remise à disposition indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.