

Exacyl 500 mg, comprimé pelliculé – [tranexamique (acide)]

Remise à disposition 01/10/2025

DCI

tranexamique (acide)

Indications

- Accidents hémorragiques dus à un état fibrinolytique primitif généralisé ;
- Accidents hémorragiques au cours d'un traitement à effet fibrinolytique ;
- Accidents hémorragiques entretenus par une fibrinolyse locale, comme c'est le cas dans :
 - ménorragies et métrorragies :
 - par dysfonctionnement hormonal ;
 - secondaires à des lésions traumatiques ou infectieuses, ou dégénératives de l'utérus ;
 - hémorragies digestives ;
 - hématuries d'origine basse :
 - des adénomes prostatiques ;
 - des néoplasies malignes prostatiques et vésicales ;
 - des lithiases, ;
 - et plus généralement des affections urinaires hémorragiques, au décours des interventions chirurgicales prostatiques et des actes chirurgicaux intéressant le tractus urinaire ;
 - hémorragies opératoires otorhinolaryngologiques (adénoïdectomies et amygdalectomies).

Laboratoire exploitant

Cheplapharm

Observations particulières

- Remise à disposition normale à compter de début octobre 2025

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les autres États membres de l'Union européenne ont été suspendues. En outre, le journal officiel du 27 janvier 2016 a introduit la qualification de restriction temporaire de l'approvisionnement en médicament, qui s'applique et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.

