

Exacyl 500 mg, comprimé pelliculé - [tranexamique (acide)]

Remise à disposition 01/10/2025

DCI

tranexamique (acide)

Indications

- Accidents hémorragiques dus à un état fibrinolytique primitif généralisé ;
- Accidents hémorragiques au cours d'un traitement à effet fibrinolytique ;
- Accidents hémorragiques entretenus par une fibrinolyse locale, comme c'est le cas dans :
 - ménorragies et métrorragies :
 - par dysfonctionnement hormonal ;
 - secondaires à des lésions traumatiques ou infectieuses, ou dégénératives de l'utérus ;
 - hémorragies digestives ;
 - hématuries d'origine basse :
 - des adénomes prostatiques ;
 - des néoplasies malignes prostatiques et vésicales ;
 - des lithiases, ;
 - et plus généralement des affections urinaires hémorragiques, au décours des interventions chirurgicales prostatiques et des actes chirurgicaux intéressant le tractus urinaire ;
 - hémorragies opératoires otorhinolaryngologiques (adénoïdectomies et amygdalectomies).

Laboratoire exploitant

Cheplapharm

Observations particulières

- Remise à disposition normale à compter de début octobre 2025

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les autorités réglementaires (décret du 27 juillet 2016, publié au Journal officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L.5121-30 et L.5121-31) sont interdites jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.

