PUBLIÉ LE 24/01/2025 - MIS À JOUR LE 17/03/2025

Tetralysal 150 mg, gélule – [lymécycline]

Remise à disposition 17/03/2025

DCI

Lymécycline

Indications

Elles procèdent de l'activité antibactérienne des caractéristiques pharmacocinétiques de la lymécycline. Elles tiennent compte à la fois de la situation de cet antibiotique dans l'éventail des produits antibactériens actuellement disponibles et des connaissances actualisées sur la sensibilité des espèces bactériennes.

Elles sont limitées aux infections suivantes :

- brucellose,
- pasteurelloses,
- infections pulmonaires,
- infections génito-urinaires et ophtalmiques à Chlamydiae,
- infections pulmonaires et génito-urinaires à mycoplasmes,
- rickettsioses,
- Coxielea burnetti (fièvre Q),
- gonococcie,
- infections ORL et broncho-pulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës des bronchites chroniques,
- tréponèmes (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux βlactamines),
- spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose),
- choléra,
- acné inflammatoire sévère et moyenne, composante inflammatoire des acnés mixtes.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

Laboratoire exploitant

Galderma International

Observations particulières

- Remise à disposition normale depuis mi-mars 2025