

# Baclofène EG 10 mg, comprimé sécable – [baclofène]

Tension d'approvisionnement : 01/02/2025

## Indications

### Adulte

Le baclofène est indiqué comme traitement des :

- Contractures spastiques de la sclérose en plaques.
- Contractures spastiques des affections médullaires (d'étiologie infectieuse, dégénérative, traumatique, néoplasique).
- Contractures spastiques d'origine cérébrale.

### Population pédiatrique (6 à 18 ans)

Le baclofène est indiqué comme traitement symptomatique des :

- Contractures spastiques d'origine cérébrale (infirmité motrice cérébrale infantile, accident cérébro-vasculaire, maladie cérébrale néoplastique ou dégénérative).
- Spasticité musculaire survenant dans les maladies de la moelle épinière d'origine infectieuse, dégénérative, traumatique, néoplastique ou secondaire à une sclérose en plaques, une paralysie spinale spastique, une sclérose latérale amyotrophique, une syringomyélie, une myélite transverse.

## Laboratoire exploitant

EG Labo - Laboratoires Eurogenerics

## Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Date de remise à disposition indéterminée

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles à la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens, l'ANSM a publié au 10/02/2025 un article d'information de mise à disposition des articles concernés dans le cadre de la santé publique, jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national et respecté.*