

Baclofène EG 10 mg, comprimé sécable – [baclofène]

Tension d'approvisionnement 01/02/2025

Indications

Adulte

Le baclofène est indiqué comme traitement des :

- Contractures spastiques de la sclérose en plaques.
- Contractures spastiques des affections médullaires (d'étiologie infectieuse, dégénérative, traumatique, néoplasique).
- Contractures spastiques d'origine cérébrale.

Population pédiatrique (6 à 18 ans)

Le baclofène est indiqué comme traitement symptomatique des :

- Contractures spastiques d'origine cérébrale (infirmité motrice cérébrale infantile, accident cérébro-vasculaire, maladie cérébrale néoplasique ou dégénérative).
- Spasticité musculaire survenant dans les maladies de la moelle épinière d'origine infectieuse, dégénérative, traumatique, néoplasique ou secondaire à une sclérose en plaques, une paralysie spinale spastique, une sclérose latérale amyotrophique, une syringomyélie, une myélite transverse.

Laboratoire exploitant

EG Labo - Laboratoires Eurogenerics

Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : mi-mars 2025

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles de vente et l'exportation du médicament par les autorités compétentes, le 27 janvier 2025, des dispositions des articles L542, L543 et L519-17 du Code de la Santé Publique ont été prises en application de l'article 17 de la loi n° 2024-1197 du 10 octobre 2024 relative à la sécurité sanitaire des médicaments et respectée.