

Méthylprednisolone Viatris 20 mg, poudre pour solution injectable (IM-IV) – [méthylprednisolone (hydrogénosuccinate de)]

Tension d'approvisionnement 03/02/2025

DCI

Méthylprednisolone (hydrogénosuccinate de)

Indications

Les indications sont :

- celles de la corticothérapie générale per os, lorsque la voie parentérale est nécessaire en cas d'impossibilité de la voie orale (vomissements, aspiration gastrique, troubles de la conscience)
- les affections nécessitant un effet thérapeutique rapide :
 - allergiques :
 - oedème de Quincke sévère en complément des antihistaminiques,
 - choc anaphylactique en complément de l'adrénaline.
 - infectieuses :
 - fièvre typhoïde sévère, en particulier avec confusion mentale, choc, coma,
 - laryngite striduleuse (laryngite sous-glottique) chez l'enfant.
 - neurologiques :
 - oedème cérébral (tumeurs, abcès à toxoplasme...)
 - ORL :
 - dyspnée laryngée.

Laboratoire exploitant

Viatris Santé

Observations particulières

- Situation à l'hôpital : Tension
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue indéterminée



Consultez le courrier de la société Viatris en date du 25/02/2025 à destination des professionnels de santé

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de réserver les stocks disponibles à usage et l'exportation du médicament par les professionnels de santé, l'ANSM a publié au Journal Officiel le 27 janvier 2016 les dispositions des articles L1512-30 et L1512-31 du Code de la Santé Publique. Jusqu'à la fin de la période de responsabilité du médicament, les professionnels de santé peuvent continuer à approvisionner leurs stocks et approcher les professionnels de santé concernés et respectés.