

PUBLIÉ LE 28/02/2025 - MIS À JOUR LE 24/03/2025

Iopidine 0.5 %, collyre en solution - [apraclonidine

(chlorhydrate d')]	

DCI

Apraclonidine (chlorhydrate d')

Remise à disposition 24/03/2025

Indications

- Dans le traitement additionnel à court terme du glaucome chronique chez les patients recevant un traitement médical à la dose maximale tolérée et nécessitant une réduction supplémentaire de la pression intra-oculaire (PIO) afin de retarder le traitement au laser ou le traitement chirurgical.
- L'efficacité de lopidine à réduire la PIO diminue avec le temps chez la majorité des patients. Même si certains patients ont pu être traités avec succès par lopidine sur de plus longues périodes, l'effet bénéfique n'excède pas un mois chez la plupart des patients.
- L'ajout de lopidine chez des patients utilisant déjà deux médicaments réduisant la formation d'humeur aqueuse (c'està-dire bêta-bloquants plus inhibiteur de l'anhydrase carbonique) comme un traitement médical maximal toléré, ne se traduit pas nécessairement par un effet bénéfique supplémentaire. En effet, lopidine agit en réduisant la formation d'humeur aqueuse et l'addition d'un troisième médicament agissant par ce mécanisme ne conduit pas nécessairement à un abaissement significatif de la PIO.

Laboratoire exploitant

Essential Pharma

Observations particulières

• Remise à disposition normale depuis le 24 mars 2025