

Spécialités à base de Lévofoxacine 500 mg en comprimé pelliculé sécable - [lévofoxacine]

Remise à disposition 11/08/2025

DCI

Lévofoxacine

Indications

Indiqué chez les adultes pour le traitement des infections suivantes :

- Pyélonéphrites aigües et infections compliquées des voies urinaires ;
- Prostatites chroniques bactériennes ;
- Maladie du charbon : prophylaxie post-exposition et traitement curatif.

Pour les infections mentionnées ci-dessous, Lévofoxacine doit être utilisé uniquement lorsque les autres antibiotiques habituellement recommandés pour le traitement de ces infections, sont jugés inappropriés.

- Sinusites aiguës bactériennes ;
- Exacerbations aiguës de broncho-pneumopathie chronique obstructive, y compris bronchite chronique ;
- Pneumonies communautaires ;
- Infections compliquées de la peau et des tissus mous ;
- Cystites non compliquées.

Lévofoxacine peut également être utilisé en relais d'un traitement intraveineux initial de lévofoxacine chez les patients ayant montré une amélioration de leur état.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

Laboratoire exploitant

Tous les laboratoires

Observations particulières

- Le besoin est globalement couvert mais certaines spécialités sont encore en tension.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les autorités de santé publique (l'ANSM et l'Agence régionale de santé) sont interdites (en vertu de l'article L. 5121-30 et de l'article L. 5124-17-3 du code la Santé Publique).
Jusque à la mise à disposition normale du médicament, permettant une approvisionnement continu et approprié du marché national.

