

PUBLIÉ LE 24/04/2025 - MIS À JOUR LE 07/05/2025

Levmentin 1 g/200 mg, poudre pour solution injectable pour perfusion (IV) – [amoxicilline sodique/potassium (clavulanate de)]

position 07	/05	/2025

DCI

Amoxicilline sodique, potassium (clavulanate de)

Indications

Levmentin est indiqué pour le **traitement des infections suivantes chez l'adulte et l'enfant** (voir rubriques 4.2, 4.4 et 5.1) :

- Infections sévères O.R.L (telles que mastoïdite, infections péri-amygdaliennes, épiglottite et sinusite, lorsqu'elles sont accompagnées de signes et symptômes systémiques sévères);
- Exacerbation de bronchite chronique (diagnostiquée de façon appropriée) ;
- Pneumonie aiguë communautaire ;
- Cystite;
- Pyélonéphrite ;
- Infections de la peau et des tissus mous, en particulier cellulite, morsures animales, abcès dentaire sévère avec propagation de cellulite;
- Infections des os et des articulations, en particulier ostéomyélite ;
- Infections intra-abdominales;
- Infections génitales de la femme.

Prophylaxie des infections post-opératoires chez l'adulte impliquant :

- L'appareil digestif;
- La cavité pelvienne ;
- La tête et le cou ;
- Le système biliaire.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

Laboratoire exploitant

Laboratoires Delbert SAS

Observations particulières

•	Remise à disposition normale depuis le 07/05/2025