

Zovirax 500 mg, poudre pour solution injectable (IV) – [aciclovir]

Remise à disposition 23/07/2025

DCI

Aciclovir

Indications

Chez le sujet immunodéprimé

- Infections à virus Varicelle Zona (VZV),
- Infection à virus Herpes Simplex (HSV).

Chez le sujet immunocompétent

- Infections à VZV
 - Zona grave par l'extension ou par l'évolutivité des lésions,
 - Varicelle chez la femme enceinte dont l'éruption survient dans les 8 à 10 jours avant l'accouchement,
 - Varicelle du nouveau-né,
 - Le nouveau-né avant toute éruption, lorsque la mère a débuté une varicelle dans les 5 jours précédents et les 2 jours suivants l'accouchement,
 - Formes graves de varicelle chez l'enfant de moins de 1 an,
 - Varicelle compliquée, en particulier de pneumopathie varicelleuse,
- Infections à HSV
 - Primo-infection génitale herpétique sévère,
 - Traitement des gingivo-stomatites herpétiques aiguës, lorsque la gêne fonctionnelle rend la voie orale impossible,
 - Traitement du syndrome de Kaposi Juliusberg,
 - Traitement de la méningo-encéphalite herpétique.

Laboratoire exploitant

Glaxosmithkline

Observations particulières

- Remise à disposition normale à compter de fin juillet 2025

