

Wilfactin 100 UI/mL, poudre et solvant pour solution injectable - [facteur Willebrand de coagulation humain]

Tension d'approvisionnement 04/04/2025

DCI

Facteur Willebrand de coagulation humain

Indications

- Wilfactin est indiqué dans le traitement et la prévention des hémorragies et en situation chirurgicale chez les patients atteints de la maladie de Willebrand (MW) quand le traitement seul par la desmopressine (DDAVP) est inefficace ou contre-indiqué.
- Wilfactin peut être utilisé chez tous les groupes d'âge.
- Wilfactin ne doit pas être utilisé dans le traitement de l'Hémophilie A.

Laboratoire exploitant

LFB Médicaments

Observations particulières

- Situation à l'hôpital : tension
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Wilfactin 1000 UI/10 mL, polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable, initialmente destinadas au marché colombien.

↓ Lettre d'information du laboratoire en date du 14/10/2025 à l'attention des professionnels de santé (05/01/2025)

- Contingentement qualitatif : Wilfactin est réservé aux patients en prophylaxie long terme

↓ Lettre du LFB du 18/06/2025 à destination des professionnels de santé (03/07/2025)

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les autorités compétentes sont interdites, sauf pour les besoins de l'assurance maladie et des distributions des autorités de santé publique, dans le cadre d'un approvisionnement continu et approprié du marché national.

- Voir toutes les produits



PUBLIÉ LE 03/07/2025

Recommandations dans l'utilisation d'alternatives à certains médicaments dérivés du sang du LFB

SURVEILLANCE
PHARMACOVIGILANCE

+ [Voir toutes les produits](#)