

PUBLIÉ LE 18/07/2025 - MIS À JOUR LE 19/08/2025

Micafungine Viatris 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion – [micafungine sodique]

pour	periusion -	[micarungine sourque]

Remise à disposition 18/08/2025

DCI

micafungine sodique

Indications

Micafungine Viatris est indiquée pour

Adulte, adolescent d'âge ≥ 16 ans et personnes âgées

- Traitement de la candidose invasive
- Traitement de la candidose œsophagienne chez les patients pour lesquels un traitement intraveineux est approprié
- Prévention des infections à Candida chez les patients bénéficiant d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ou chez les patients chez qui une neutropénie est attendue (taux absolu de neutrophiles < 500 cellules / μl) pendant au moins 10 jours

Enfant (y compris nouveau-né) et adolescent d'âge < 16 ans

- Traitement de la candidose invasive
- Prévention des infections à Candida chez les patients bénéficiant d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ou chez les patients chez qui une neutropénie est attendue (taux absolu de neutrophiles < 500 cellules / μl) pendant au moins 10 jours.

La décision d'utiliser Micafungine Viatris doit tenir compte du risque potentiel de développement de tumeurs hépatiques (voir rubrique 4.4). Ainsi, Micafungine Viatris ne doit être utilisée que si l'administration d'autres antifongiques n'est pas appropriée.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles/nationales concernant l'utilisation appropriée des antifongiques.

Laboratoire exploitant

Viatris Santé

Observations particulières

Remise à disposition normale depuis le 18/08/2025