

Extencilline 1,2 MUI, poudre et solvant pour suspension injectable IM – [benzathine benzylopénicilline]

Tension d'approvisionnement 25/08/2025

DCI

Benzathine benzylopénicilline

Indications

Pour le traitement de :

- Érysipèle ;
- Syphilis : syphilis précoce (primaire et secondaire) ;
- Syphilis tardive (à l'exception de la neurosyphilis et d'anomalies du LCR) ;
- Pian ;
- Pinta.

Pour la prophylaxie de :

- Rhumatisme articulaire aigu (chorée, cardiopathie rhumatismale) ;
- Glomérulonéphrite post-streptococcique ;
- Érysipèle.

Lors de l'utilisation de Extencilline, il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens

Laboratoire exploitant

Delbert SAS

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement.
- Mise en place d'un contingentement quantitatif en ville, l'hôpital n'est pas impacté par cette mesure.
- Remise à disposition normale indéterminée.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles devant et l'exportation du médicament par les autorités compétentes, une mesure de contingentement quantitatif a été mise en place à l'exportation du médicament. Cette mesure est publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L.512-130 et L.512-131 du code de la santé publique. Cette mesure est applicable à compter du 27 janvier 2016. Les dispositions de cette mesure ne s'appliquent pas aux approvisionnements en continu et respectent les obligations de continuité de l'approvisionnement en médicament.

