

PUBLIÉ LE 28/01/2026

Extencilline 2,4 MUI, poudre et solvant pour suspension injectable IM - [benzathine benzylpénicilline]

Tension d'approvisionnement 13/01/2026

DCI

Benzathine benzylpénicilline

Indications

Pour le traitement de :

- Érysipèle ;
- Syphilis : syphilis précoce (primaire et secondaire) ;
- Syphilis tardive (à l'exception de la neurosyphilis et d'anomalies du LCR) ;
- Pian ;
- Pinta.

Pour la prophylaxie de :

- Rhumatisme articulaire aigu (chorée, cardiopathie rhumatismale) ;
- Glomérulonéphrite post-streptococcique ;
- Érysipèle.

Lors de l'utilisation de Extencilline, il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens

Laboratoire exploitant

Delbert SAS

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement.
- Mise en place d'un contingentement quantitatif en ville, l'hôpital n'est pas impacté par cette mesure.
- Remise à disposition normale indéterminée.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les autorités de santé publique (art. L. 5121-30 et R. 5124-17-3 du code de la Santé Publique) jusqu'à renouvellement de la tension d'approvisionnement, permettant un approvisionnement continu et respectueux

