

Extencilline 2,4 MUI, poudre et solvant pour suspension injectable IM – [benzathine benzylopénicilline]

PUBLIÉ LE 28/01/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 13/01/2026

DCI

Benzathine benzylopénicilline

Indications

Pour le traitement de :

- Érysipèle ;
- Syphilis : syphilis précoce (primaire et secondaire) ;
- Syphilis tardive (à l'exception de la neurosyphilis et d'anomalies du LCR) ;
- Pian ;
- Pinta.

Pour la prophylaxie de :

- Rhumatisme articulaire aigu (chorée, cardiopathie rhumatismale) ;
- Glomérulonéphrite post-streptococcique ;
- Érysipèle.

Lors de l'utilisation de Extencilline, il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens

Laboratoire exploitant

Delbert SAS

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement.
- Mise en place d'un contingentement quantitatif en ville, l'hôpital n'est pas impacté par cette mesure.
- Remise à disposition normale indéterminée.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.