

Mydriaticum 2 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose – [tropicamide]

PUBLIÉ LE 29/01/2026 - MIS À JOUR LE 22/05/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 20/01/2026

DCI

tropicamide

Indications

Mydriaticum 2 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose est indiqué pour l'obtention d'une mydriase :

- à but diagnostic : permettant la réalisation des examens du fond d'oeil ;
- à but thérapeutique : en particulier, en pré-opératoire et avant photocoagulation.

Laboratoire exploitant

Thea Pharma

Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
 - Présentation boîte de 1 récipient unidose polyéthylène de 0,4 ml : contingentement quantitatif en ville uniquement
 - Présentation boîte de 20 récipients unidoses polyéthylène de 0,4 ml : contingentement quantitatif en ville uniquement
- Date de remise à disposition prévue : fin septembre 2026

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.