

Kenacort Retard 40 mg/1 ml, suspension injectable – [triamcinolone (acétonide de)]

Tension d'approvisionnement 17/02/2026

DCI

Triamcinolone (acétonide de)

Indications

Kenacort Retard est une préparation à action prolongée. Elle n'est pas indiquée dans les situations aiguës.

Usage systémique :

- Rhinite allergique saisonnière après échec des autres thérapeutiques (antihistaminique par voie générale, corticoïde intra-nasal, ou corticoïde per os en cure courte).

Usage local :

- Ce sont celles de la corticothérapie locale, lorsque l'affection justifie une forte concentration locale. Toute prescription d'injection locale doit faire la part du danger infectieux notamment du risque de favoriser une prolifération bactérienne.

Ce produit est indiqué dans les affections :

- Dermatologiques : cicatrices chéloïdes
- Rhumatologiques : injections intra-articulaires : arthrites inflammatoires, arthrose en poussée

Laboratoire exploitant

BristolMyers Squibb

Observations particulières

- Situation en ville : rupture
- Situation à l'hôpital : non impactée
- ↓ Lettre d'information du laboratoire d'avril 2026 à l'attention des professionnels de santé (03/04/2026)
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens 2026 doit être limitée au territoire national et à l'exportation des articles 1709 et 1710 du Code de Commerce. Cette limitation s'applique jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, par mettant un approvisionnement en cours et approprié du marché national et respectée

