

# Kenacort Retard 40 mg/1 ml, suspension injectable – [triamcinolone (acétonide de)]

PUBLIÉ LE 18/02/2026 - MIS À JOUR LE 18/05/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 17/02/2026

## DCI

Triamcinolone (acétonide de)

## Indications

Kenacort Retard est une préparation à action prolongée. Elle n'est pas indiquée dans les situations aiguës.

## Usage systémique :

- Rhinite allergique saisonnière après échec des autres thérapeutiques (antihistaminique par voie générale, corticoïde intra-nasal, ou corticoïde per os en cure courte).

## Usage local :

- Ce sont celles de la corticothérapie locale, lorsque l'affection justifie une forte concentration locale. Toute prescription d'injection locale doit faire la part du danger infectieux notamment du risque de favoriser une prolifération bactérienne.

Ce produit est indiqué dans les affections :

- Dermatologiques : cicatrices chéloïdes
- Rhumatologiques : injections intra-articulaires : arthrites inflammatoires, arthrose en poussée

## Laboratoire exploitant

Bristolmyers Squibb

## Observations particulières

- Situation en ville : rupture
- Situation à l'hôpital : non impactée
- ↓ Lettre d'information du laboratoire à l'attention des professionnels de santé (18/05/2026)
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).*

*Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.*

