

Micropakine L.P. 750 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose – [acide valproïque, sodium (valproate de)]

PUBLIÉ LE 27/02/2026

REMISE À DISPOSITION 27/02/2026

DCI

acide valproïque, sodium (valproate de)

Indications

Chez l'adulte

- Soit en monothérapie, soit en association à un autre traitement antiépileptique :
 - Traitement des épilepsies généralisées : crises cloniques, toniques, tonico-cloniques, absences, crises myocloniques, atoniques, et syndrome de Lennox-Gastaut ;
 - Traitement des épilepsies partielles : crises partielles avec ou sans généralisation secondaire.

Chez l'enfant

- Soit en monothérapie, soit en association à un autre traitement antiépileptique :
 - Traitement des épilepsies généralisées : crises cloniques, toniques, tonico-cloniques, absences, crises myocloniques, atoniques, et syndrome de Lennox-Gastaut ;
 - Traitement des épilepsies partielles : crises partielles avec ou sans généralisation secondaire.
- Prévention de la récurrence de crises après une ou plusieurs convulsions fébriles, présentant les critères de convulsions fébriles compliquées, en absence d'efficacité d'une prophylaxie intermittente par benzodiazépines.

Laboratoire exploitant

Sanofi Winthrop Industrie

Observations particulières

- Remise à disposition depuis fin février 2026