

Betneval 0,1 %, crème - [bétaméthasone (valérate de)]

Tension d'approvisionnement : 03/04/2026

DCI

Bétaméthasone (valérate de)

Indications

- Indications privilégiées où la corticothérapie locale est tenue pour le meilleur traitement :
 - Eczéma de contact ;
 - Dermatite atopique.
- Indications où la corticothérapie locale est l'un des traitements habituels :
 - Dermite de stase ;
 - Psoriasis (à l'exclusion des plaques très étendues) ;
 - Lichen ;
 - Prurigo non parasitaire ;
 - Dyshidrose ;
 - Lichen scléro-atrophique génital ;
 - Granulome annulaire ;
 - Lupus érythémateux discoïde ;
 - Dermite séborrhéique à l'exception du visage ;
 - Traitement symptomatique du prurit du mycosis fongicoïde.
- Indications de circonstance pour une durée brève :
 - Piqûres d'insectes et prurigo parasitaire après traitement étiologique.
- La forme crème est plus particulièrement destinée aux lésions aiguës, suintantes.

Laboratoire exploitant

Laboratoire Glaxosmithkline

Observations particulières

- Situation en ville : tension

- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : mi mai 2026

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de réserver les stocks disponibles à usage et l'expectation du médicament par les autorités de santé publique 2016 et publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L1512-130 et L5124-17 du Code de la Santé Publique) jusqu'à la mise à disposition normale du médicament, que mettre à l'approvisionnement en continu et approprié du médicament garanti et respectée