Betneval 0,1 %, crème – [bétaméthasone (valérate de)]

PUBLIÉ LE 08/04/2026 - MIS À JOUR LE 20/10/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 03/04/2026

DCI
Bétaméthasone (valérate de)
Indications

- Indications privilégiées où la corticothérapie locale est tenue pour le meilleur traitement :
  - Eczéma de contact ;
  - Dermatite atopique.
- Indications où la corticothérapie locale est l'un des traitements habituels :
  - Dermite de stase ;
  - Psoriasis (à l'exclusion des plaques très étendues) ;
  - Lichen ;
  - Prurigo non parasitaire ;
  - Dyshidrose ;
  - Lichen scléro-atrophique génital ;
  - Granulome annulaire ;
  - Lupus érythémateux discoïde ;
  - Dermite séborrhéique à l'exception du visage ;
  - Traitement symptomatique du prurit du mycosis fongoïde.
- Indications de circonstance pour une durée brève :
  - Piqûres d'insectes et prurigo parasitaire après traitement étiologique.
- La forme crème est plus particulièrement destinée aux lésions aiguës, suintantes.

Laboratoire exploitant
Laboratoire Glaxosmithkline

Observations particulières

- Situation en ville : tension ;
- Situation à l'hôpital : non impactée ;
- Contingentement quantitatif en ville ;
- Date de remise à disposition prévue fin octobre 2026.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la

Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.