

PUBLIÉ LE 12/11/2020 - MIS À JOUR LE 18/09/2024

# Ancotil 1 pour cent, solution pour perfusion - [Flucytosine]

Arrêt de commercialisation 31/05/2022

## DCI

Flucytosine

#### Indications

- Mycoses systémiques sévères à germes sensibles, notamment les candidoses, les cryptococcoses, les chromomycoses et certaines formes d'aspergilloses.
- Association à un autre antifongique :
  - Il est indispensable d'utiliser la flucytosine en association pour éviter au maximum la sélection de mutants résistants, notamment dans le traitement des candidoses et des cryptococcoses.
- L'association avec l'amphotéricine B est souvent synergique et jamais antagoniste.

## Laboratoire exploitant

Mylan Medical SAS

### Observations particulières

- Arrêt de commercialisation concernant la spécialité Ancotil 1 pour cent, solution pour perfusion
- Pour une préparation pharmaceutique de flucytosine et une administration par voie naso-gastrique <u>consultez les</u> <u>recommandations associées</u>
- Lettre d'information du laboratoire Mylan Medical S.A.S en date du 16/05/2022 à l'attention des professionnels de santé
- Importation par le laboratoire Intsel Chimos d'une préparation hospitalière similaire Flucytosine infu 10 mg/ml flacon de 250 ml initialement destinée au marché néerlandais
- Lettre d'information du laboratoire Intsel Chimios en date du 12/09/2024 à l'attention des professionnels de santé (18/09/2024)

  Note d'information sur le produit



PUBLIÉ LE 17/11/2020 - MIS À JOUR LE 16/11/2022

Consignes à respecter concernant l'utilisation d'Ancotil 1% (antifongique utilisé en perfusion à l'hôpital)

SURVEILLANCE - PHARMACOVIGILANCE