

Ancotil 1 pour cent, solution pour perfusion – [Flucytosine]

Arrêt de commercialisation 31/05/2022

DCI

Flucytosine

Indications

- Mycoses systémiques sévères à germes sensibles, notamment les candidoses, les cryptococcoses, les chromomycoses et certaines formes d'aspergilloses.
- Association à un autre antifongique :
 - Il est indispensable d'utiliser la flucytosine en association pour éviter au maximum la sélection de mutants résistants, notamment dans le traitement des candidoses et des cryptococcoses.
 - L'association avec l'amphotéricine B est souvent synergique et jamais antagoniste.

Laboratoire exploitant

Mylan Medical SAS

Observations particulières

- Arrêt de commercialisation concernant la spécialité Ancotil 1 pour cent, solution pour perfusion
- Pour une préparation pharmaceutique de flucytosine et une administration par voie naso-gastrique,[consultez les recommandations associées](#)

↓ Lettre d'information du laboratoire Mylan Medical S.A.S en date du 16/05/2022 à l'attention des professionnels de santé

- **Importation par le laboratoire Intsel Chimios d'une préparation hospitalière similaire Flucytosine infu 10 mg/ml flacon de 250 ml initialement destinée au marché néerlandais**

↓ Lettre d'information du laboratoire Intsel Chimios en date du 12/09/2024 à l'attention des professionnels de santé (18/09/2024) ↓ Note d'information sur le produit

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les distributeurs doit être prohibée au journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles 149 et 150 de la loi n° 2014-175 du 17 janvier 2014 relative à la sécurité publique, jusqu'à mesure d'introduction de ventes en dehors du territoire national aux distributeurs en cours d'exploitation, doit être appliquée et respectée.

Consignes à respecter concernant l'utilisation d'Ancotil 1% (antifongique utilisé en perfusion à l'hôpital)

SURVEILLANCE - PHARMACOVIGILANCE

