

# Ancotil 1 pour cent, solution pour perfusion – [Flucytosine]

PUBLIÉ LE 12/11/2020 - MIS À JOUR LE 18/09/2024

ARRÊT DE COMMERCIALISATION 31/05/2022

## DCI

Flucytosine

## Indications

- Mycoses systémiques sévères à germes sensibles, notamment les candidoses, les cryptococcoses, les chromomycoses et certaines formes d'aspergilloses.
- Association à un autre antifongique :
  - Il est indispensable d'utiliser la flucytosine en association pour éviter au maximum la sélection de mutants résistants, notamment dans le traitement des candidoses et des cryptococcoses.
- L'association avec l'amphotéricine B est souvent synergique et jamais antagoniste.

## Laboratoire exploitant

Mylan Medical SAS

## Observations particulières


- Arrêt de commercialisation concernant la spécialité Ancotil 1 pour cent, solution pour perfusion
- Pour une préparation pharmaceutique de flucytosine et une administration par voie naso-gastrique [consultez les recommandations associées](#)



Lettre d'information du laboratoire Mylan Medical S.A.S en date du 16/05/2022 à l'attention des professionnels de santé


- **Importation par le laboratoire Intsel Chimos d'une préparation hospitalière similaire Flucytosine infu 10 mg/ml flacon de 250 ml initialement destinée au marché néerlandais**



Lettre d'information du laboratoire Intsel Chimios en date du 12/09/2024 à l'attention des professionnels de santé (18/09/2024)  Note d'information sur le produit

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).*

*Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.*



PUBLIÉ LE 17/11/2020 - MIS À JOUR LE 16/11/2022

## Consignes à respecter concernant l'utilisation d'Ancotil 1% (antifongique utilisé en perfusion à l'hôpital)

**SURVEILLANCE** - PHARMACOVIGILANCE