

Synarel 0,2 mg/dose, solution pour pulvérisation nasale – [nafaréline (acétate de)]

PUBLIÉ LE 07/05/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 26/03/2026

DCI

Nafaréline (acétate de)

Indications

- Endométriose à localisation génitale et extragénitale (du stade I au stade IV).
 - L'expérience clinique relative au traitement de l'endométriose est limitée aux femmes âgées de 18 ans et plus.
- Désensibilisation hypophysaire au cours de l'induction de l'ovulation en vue d'une fécondation in vitro suivie d'un transfert d'embryons.

Laboratoire exploitant

Pfizer

Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville

↓ Lettre d'information du laboratoire Pfizer en date du 06/05/2026 à l'attention des professionnels de santé (07/05/2026)

- Les unités en stock, en quantité limitée, doivent être réservées en priorité aux patientes en cours de traitement par la Nafaréline.
- Date de remise à disposition prévue : fin juin 2026

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.