

Acide acétylsalicylique 75 mg, , comprimé gastro-résistant – [acide acétylsalicylique]

PUBLIÉ LE 21/05/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 18/05/2026

DCI

acide acétylsalicylique

Indications

Resitune 75 mg, comprimé gastro-résistant

- Prévention secondaire de l'infarctus du myocarde, des accidents ischémiques transitoires et des accidents vasculaires cérébraux ;
- Prévention de la morbidité cardiovasculaire chez les patients atteints d'angor stable ;
- Prévention de la morbidité cardiovasculaire chez les patients ayant des antécédents d'angor instable, en dehors de la phase aiguë ;
- Prévention de l'occlusion du greffon après un pontage aorto-coronarien (PAC) ou un pontage infra-inguinal ;
- Angioplastie coronaire, en dehors de la phase aiguë.

Acide acétylsalicylique Biogaran75 mg, comprimé gastro-résistant

- Angioplastie coronaire, en dehors de la phase aiguë ;
- Accidents ischémiques transitoires ;
- Prévention de la morbidité cardiovasculaire chez les patients atteints d'angor stable ;
- Prévention secondaire de l'infarctus du myocarde ;
- Angor instable ;
- Prévention secondaire ;
- Prévention de l'occlusion du greffon après un pontage aorto-coronarien (PAC) ;
- Prévention secondaire des accidents vasculaires cérébraux (AVC)

Asared 75 mg, comprimé gastro-résistant

- Prévention secondaire de l'infarctus du myocarde, des accidents ischémiques transitoires (AIT) et des accidents vasculaires cérébraux ;
- Prévention de la morbidité cardiovasculaire chez les patients atteints d'angor stable ;
- Antécédents d'angor instable, en dehors de la phase aiguë ;
- Prévention de l'occlusion du greffon après un pontage aorto-coronarien (PAC) ;
- Angioplastie coronaire, en dehors de la phase aiguë.

Asared n'est pas recommandé dans les situations d'urgence.

Aspirine Arrow 75 mg, comprimé gastro-résistant

- Aspirine Arrow est réservé à la prévention secondaire dans le cadre d'un traitement chronique ;
- Prévention secondaire de l'infarctus du myocarde ; Prévention de la morbidité cardiovasculaire chez les patients

atteints d'angor stable ;

- Antécédents d'angor instable, en dehors de la phase aiguë ;
- Prévention de l'occlusion du greffon après un Pontage Aorto-Coronarien (PAC) ;
- Angioplastie coronaire, en dehors de la phase aiguë ;
- Prévention secondaire des accidents ischémiques transitoires (AIT) et accidents vasculaires cérébraux (AVC), à condition que les hémorragies intracérébrales aient été exclues.

Aspirine Arrow n'est pas recommandé dans des situations d'urgence.

Laboratoire exploitant

Pfizer - Biogaran - Zentiva - Arrow

Observations particulières

- Situation en ville : tension ;
- Situation à l'hôpital : rupture ;
- Contingement quantitatif en ville ;
- Date de remise à disposition indéterminée.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.