Ropinirole EG 2 mg, comprimé pelliculé – [ropinirole (chlorhydrate de)]

PUBLIÉ LE 08/06/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 13/05/2026

DCI
Ropinirole (chlorhydrate de)
Indications
RopiniroleEG est indiqué dans :

- Le traitement de la maladie de Parkinson dans les conditions suivantes :
  - Traitement de première intention en monothérapie, pour retarder l'introduction de la lévodopa ;
  - En association à la lévodopa en cours d'évolution de la maladie lorsque l'effet de la dopathérapie s'épuise ou devient inconstant, et qu'apparaissent des fluctuations de l'effet thérapeutique (fluctuations de type "fin de dose" ou effets "on-off").
- Le traitement symptomatique du syndrome des jambes sans repos (SJSR) idiopathique modéré à sévère (voir rubrique 5.1).

Laboratoire exploitant
EG Labo - Laboratoires Eurogenerics

Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : février 2027

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.