

# Néosynéphrine 2,5 % Faure, collyre en solution en récipient unidose - [phényléphrine]

PUBLIÉ LE 02/07/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 13/05/2026

## DCI

phényléphrine

## Indications

Ce collyre est indiqué pour obtenir :

- une mydriase à visée diagnostique ;
- une mydriase thérapeutique ;
- une mydriase pré-opératoire.

## Laboratoire exploitant

Europhtha

## Observations particulières

- Boîte de 1 :
  - Contingentement quantitatif en ville.
- Boîte de 20 :
  - Fermeture du canal ville ;
  - Distribution auprès des cabinets d'ophtalmologie ;
  - Contingentement quantitatif à l'hôpital ;
  - Importation en cours ;
- Date de remise à disposition indéterminée.

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).*

*Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.*