

Natulan 50 mg, gélule – [procarbazine (chlorhydrate de)]

PUBLIÉ LE 27/07/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 22/07/2026

DCI

Procarbazine (chlorhydrate de)

Indications

- Lymphome de Hodgkin.
- Lymphomes non hodgkiniens, formes ganglionnaires et viscérales.
- Tumeurs cérébrales.
- Cancer du poumon à petites cellules.
- Natulan est utilisé principalement en association à d'autres antinéoplasiques.
- Enfants : Natulan est indiqué dans le traitement du lymphome de Hodgkin chez les enfants âgés de 2 à 18 ans, lorsqu'il est administré en association avec d'autres médicaments antinéoplasiques dans le cadre d'un protocole thérapeutique approprié.

Laboratoire exploitant

Centre Spécialités Pharmaceutiques

Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : septembre 2026

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.