Trisenox 2 mg/mL, solution à diluer pour perfusion – [arsenic (trioxyde d')]

PUBLIÉ LE 07/08/2026 - MIS À JOUR LE 16/09/2026

REMISE À DISPOSITION 16/09/2026

DCI
Arsenic (trioxyde d')
Indications
Trisenox est indiqué pour l'induction de la rémission et la consolidation chez des patients adultes atteints de :

- Leucémie promyélocytaire aiguë (LPA) à risque faible ou intermédiaire (numération leucocytaire : ≤ 10 x 103 /µL) nouvellement diagnostiquée, en association avec l'acide tout-trans-rétinoïque (ATRA ou trétinoïne) ;
- Leucémie promyélocytaire aiguë (LPA) en rechute/réfractaire (le traitement antérieur doit avoir comporté un rétinoïde et une chimiothérapie), caractérisée par la présence de la translocation t(15;17) et/ou la présence du gène PML/RAR-alpha (promyelocytic leukaemia/retinoic-acid-receptor-alpha). Le taux de réponse des autres sous-types de leucémie aiguë myéloblastique au trioxyde d'arsenic n'a pas été examiné.

Laboratoire exploitant
Teva Santé

Observations particulières

- Remise à disposition normale depuis le 16 septembre 2026