

Lamictal 2 mg, comprimé dispersible ou à croquer – [lamotrigine]

PUBLIÉ LE 20/08/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 04/08/2026

DCI

lamotrigineA

Indications

Epilepsie

- Adultes et adolescents âgés de 13 ans et plus :
 - Traitement en monothérapie ou en association des épilepsies partielles et généralisées, incluant les crises tonico-cloniques ;
 - Crises associées au syndrome de Lennox-Gastaut. Lamictal est administré en association à un autre traitement mais peut être l'anti-épileptique (AE) de première intention dans le syndrome de Lennox-Gastaut.
- Enfants et adolescents de 2 à 12 ans :
 - Traitement en association des épilepsies partielles et généralisées, incluant les crises tonico-cloniques et les crises associées à un syndrome de Lennox-Gastaut ;
 - Traitement en monothérapie des absences typiques.

Troubles bipolaires

- Adultes âgés de 18 ans et plus :
 - Prévention des épisodes dépressifs chez les patients présentant un trouble bipolaire de type I et qui ont une prédominance d'épisodes dépressifs.

Laboratoire exploitant

Laboratoire Glaxosmithkline

Observations particulières

- Situation en ville : tension ;
- Situation à l'hôpital : non impactée ;
- Contingement quantitatif en ville ;
- Date de remise à disposition prévue début octobre 2026.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.

