# Cotrimoxazole Teva 800 mg/160 mg, comprimé – [sulfaméthoxazole, triméthoprime]

PUBLIÉ LE 04/11/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 30/10/2026

**DCI**
Sulfaméthoxazole, triméthoprime
**Indications**
Elles procèdent de l'activité antibactérienne et antiparasitaire du produit, des caractéristiques pharmacocinétiques du sulfaméthoxazole et du triméthoprime, du risque d'effets indésirables (hématologiques et cutanés en particulier) et doivent tenir compte, dans un pays donné, de l'évolution de la sensibilité des germes vis-à-vis du produit et des autres antibiotiques disponibles. Selon les indications et les germes en cause, il convient d'utiliser en première intention l'antibiotique présentant le meilleur rapport bénéfice/risque.
Elles sont limitées aux infections de l'adulte dues aux germes sensibles (voir rubriques 4.2, 4.3, 4.4, 4.8 et 5.1).

Tout particulièrement :

- Traitement curatif :
  - Des infections à Pneumocystis jirovecii ;
  - Des infections uro-génitales de l'homme, notamment les prostatites ;
- Prévention des infections à Pneumocystis jirovecii, chez l'immunodéprimé, et notamment :
  - Chez les patients infectés par le VIH et à risque de pneumocystose. Dans ces cas, l'incidence de la toxoplasmose cérébrale semble également diminuée au cours d'études menées chez les patients qui reçoivent l'association triméthoprime-sulfaméthoxazole et le tolèrent pendant de longues périodes ;
  - En cas de greffe de moelle osseuse ou de transplantation d'organe.

D'autre part :

- En tenant compte du rapport bénéfice/risque par rapport à d'autres produits, de l'épidémiologie et des résistances bactériennes observées dans ces pathologies.
  Traitement :
  - Des infections urinaires hautes et basses de la femme ; notamment traitement monodose de la cystite aiguë non compliquée de la femme de moins de 65 ans (voir rubrique 4.4) ;
  - Des otites et sinusites, mais uniquement après documentation bactériologique (voir rubrique 4.4) ;
  - De certaines infections broncho-pulmonaires ;
  - Des infections digestives, et de la fièvre typhoïde.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.
**Laboratoire exploitant**
Teva Santé

**Observations particulières**

- Situation en ville : tension ;

- Situation à l'hôpital : non impactée ;
- Contingentement quantitatif en ville ;
- Date de remise à disposition prévue : janvier 2027.

*Un délai de quelques jours à plusieurs semaines peut être nécessaire pour la remise à disposition au niveau de l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament, notamment jusqu'en pharmacie*

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).*

*Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.*